

Chapitre 5 : Calcul intégral

Axel Carpentier

Brevet de technicien supérieur :

Enveloppe des bâtiments, conception et réalisation

1. Primitives

1.1 Définitions

1.2 Calcul de primitives

2. Intégrale d'une fonction

2.1 Définition

2.2 Interprétation graphique : calcul d'aire

3. Propriétés de l'intégrale

3.1 Relation de Chasles

3.2 Linéarité

3.3 Inégalités

3.4 Valeur moyenne

4. Méthode d'intégration

4.1 Intégration par partie

4.2 Changement de variable

Définition:

Soit F une fonction définie sur $I \subset \mathbb{R}$. On dit que F est une primitive de f lorsque F est dérivable sur I et que $F' = f$.

Remarque

Il n'y a pas unicité d'une primitive.

Exemple:

- Une primitive de $f : x \mapsto 3x^2 + 2x + 8$ est donné par $F : x \mapsto x^3 + x^2 + 8x$. En effet on a bien $F' = f$.
- Soit f la fonction définie sur \mathbb{R} par $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 3}}$, alors la fonction F définie sur \mathbb{R} par $F(x) = \sqrt{x^2 + 3} + \pi$ est une primitive de f .

Théorème:

Toute fonction continue sur un intervalle admet des primitives.

Propriété:

Soit F une primitive d'une fonction f définies sur I . Les primitives de f sont données par les fonctions $G = F + k, k \in \mathbb{R}$.

Propriété:

Soit f une fonction admettant des primitives sur I . Soit $x_0 \in I$ et $y_0 \in \mathbb{R}$. Il existe une unique primitive F telle que $F(x_0) = y_0$.

Exercice:

Vérifier que $F : x \mapsto \frac{5}{2}x^2 + 3x - 2$ avec $F(1) = \frac{7}{2}$ est l'unique primitive de $f : x \mapsto 5x + 3$.

Primitives de fonctions usuelles

A l'aide du tableau des dérivées des fonctions de références, on en déduit les primitives suivantes.

	Fonction f	Primitive F
Constante	$f(x) = a, a \in \mathbb{R}$ sur $I = \mathbb{R}$	$F(x) = ax$ sur $I = \mathbb{R}$
Puissance	$f(x) = x^n, n \in \mathbb{N}^*$ sur $I = \mathbb{R}$	$F(x) = \frac{x^{n+1}}{n+1}$ sur $I = \mathbb{R}$
Inverse	$f(x) = \frac{1}{x}$ sur $I = \mathbb{R}^*$	$F(x) = \ln(x)$ sur $I = \mathbb{R}_+^*$
Puissance inverse	$f(x) = \frac{1}{x^n}, n > 1$ sur $I = \mathbb{R}^*$	$F(x) = -\frac{1}{(n-1)x^{n-1}}$ sur $I = \mathbb{R}_+^*$
Cosinus	$f(x) = \cos(x)$ sur $I = \mathbb{R}$	$F(x) = \sin(x)$ sur $I = \mathbb{R}$
Sinus	$f(x) = \sin(x)$ sur $I = \mathbb{R}$	$F(x) = -\cos(x)$ sur $I = \mathbb{R}$
Exponentielle	$f(x) = e^x$ sur \mathbb{R}	$F(x) = e^x$ sur $I = \mathbb{R}$

Propriété:

- Soit F et G des primitives respectives de f et g sur I . $F + G$ est alors une primitive de $f + g$.
- Soit F une primitive de f sur I et $\alpha \in \mathbb{R}$. αF est alors une primitive de αf .

Remarque

Contrairement à la dérivation, il n'existe pas de formule permettant de trouver directement une primitive d'un produit ou d'un quotient de fonctions.

Exemple:

Une primitive sur \mathbb{R}_+^* de la fonction $f : x \mapsto x^2 - \frac{3}{x}$ est donnée par $F : x \mapsto \frac{x^3}{3} - 3 \ln(x)$

Exercice:

Déterminer la primitive F de $f(x) = x^3 + \cos(x)$ avec $f(\pi) = 0$.

Opérations sur les primitives

Soit $u : I \rightarrow J$ une fonction dérivable de dérivée u' et $v : J \mapsto K$

Fonction f	Primitive F
$f = u'u$	$F = \frac{u^2}{2}$
$f = u'u^n$	$F = \frac{u^{n+1}}{n+1}$
$f = u'e^u$	$F = e^u$
$f = \frac{u'}{u}$	$F = \ln(u)$ si $J \subset \mathbb{R}_+^*$
$f = \frac{u'}{u^n}, n \geq 2$	$F = -\frac{1}{(n-1)u^{n-1}}$
$f = u'e^u$	$F = e^u$
$f = u' \cos(u)$	$F = \sin(u)$
$f = u' \sin(u)$	$F = -\cos(u)$
$f = u' \times (v' \circ u)$	$F = v \circ u$

Exercice:

Déterminer la primitive F de $f : x \mapsto xe^{1-x^2}$ telle que $F(1) = 0$.

Définition:

On appelle intégrale de f sur $[a ; b]$ le nombre réel $F(b) - F(a)$ où F est une primitive quelconque de f sur I . Il est noté

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) = [F(x)]_a^b$$

Remarque

La variable x est dite muette, elle n'intervient pas dans le résultat. On peut donc utiliser n'importe quelle lettre.

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(t) dt = \int_a^b f(u) du$$

Exercice:

Calculer l'intégrale $\int_2^3 x \, dx$.


Définition:

Si f est une fonction positive sur $[a ; b]$, alors $\int_a^b f(x) dx$ est égal à l'aire du domaine compris entre la courbe de f , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = a$ et $x = b$ exprimée en unité d'aire.

Aire d'une fonction positive

Exercice:

Calculer l'aire du domaine compris entre la courbe d'équation $y = \frac{1}{x}$, l'axe des abscisses, et les droites d'équations $x = \frac{1}{2}$ et $x = 4$ dans un repère orthonormé (O, \vec{i}, \vec{j}) d'unité graphique 1 cm.




Définition:

Si f est une fonction négative sur $[a ; b]$, alors $\int_a^b f(x) dx$ est égal à l'opposée de l'aire du domaine compris entre la courbe de f , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = a$ et $x = b$ exprimée en unité d'aire.

Aire d'une fonction négative

Exercice:

Calculer l'aire du domaine compris entre la courbe d'équation $y = \frac{x^3}{27} - \frac{x^2}{3}$, l'axe des abscisses, et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 9$ dans un repère orthonormé (O, \vec{i}, \vec{j}) d'unité graphique 1 cm.




Aire d'une fonction quelconque : découpage d'aire

Pour calculer l'aire d'un domaine définie par une fonction changeant de signe, il faut découper l'intervalle en plusieurs intervalles sur lesquels la fonction est de signe constant.

Exercice:

Calculer l'aire du domaine compris entre la courbe d'équation $y = x^2 - x - 2$, l'axe des abscisses, et les droites d'équations $x = -1$ et $x = 3$ dans un repère orthonormé (O, \vec{i}, \vec{j}) d'unité graphique 1 cm.



Propriété: Relation de Chasles

Soit f une fonction continue sur un intervalle $I \subset \mathbb{R}$. Pour tous $a, b, c \in I$ on a :

$$\int_a^c f(x)dx = \int_a^b f(x)dx + \int_b^c f(x)dx$$

Exercice:

Soit f définie pour tout $x \in [-2; 4]$ par $\begin{cases} x & \text{si } x \in [-2; 1] \\ \frac{1}{x} & \text{si } x \in [1; 4] \end{cases}$. Calculer $\int_{-2}^4 f(x)dx$.

Proposition:

Soient f et g deux fonctions continues sur un intervalle $I \subset \mathbb{R}$ et $\alpha \in \mathbb{R}$.

$$\int_a^b f(x) + g(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx \quad \text{et} \quad \int_a^b \alpha f(x) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx$$

Exercice:

Soit f une fonction telle que $\int_1^3 f(x) dx = 2$. Calculer $\int_1^3 \frac{3}{2} f(x) + x dx$.

Propriété:

Soit f une fonction continue et positive sur $[a; b]$ alors on a $\int_a^b f(x)dx \geq 0$

Corollaire:

Soit f, g deux fonctions continues sur $[a; b]$. Si pour tout $x \in [a; b]$, $f(x) \leq g(x)$. Alors on a $\int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b g(x)dx$.

Exercice:

Démontrer que $\frac{8}{9} \leq \int_0^8 \frac{dx}{1+x} \leq 8$.

Définition:

Soit f une fonction continue sur l'intervalle $[a; b]$ non trivial. On appelle valeur moyenne de f la quantité :

$$\mu_f = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

Exercice:

Calculer la valeur moyenne de $f : x \mapsto (2-x)(x-1)$ sur $[-1; 0]$.

Propriété:

Soit u, v deux fonctions dérivables de dérivées continues sur $[a; b]$.

$$\int_a^b u(x)v'(x)dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x)$$

Exemple:

On désire calculer l'intégrale $I = \int_0^1 xe^x dx$.

- On pose $u'(x) = e^x v(x) = x$ d'où $u(x) = e^x v'(x) = 1$.
- Donc : $\int_0^1 xe^x dx = [xe^x]_0^1 - \int_0^1 e^x dx = (1e^1 - 0 e^0) - [e^x]_0^1 = e - e + 1 = 1$.

Changement de variable du type $x \rightarrow x + \beta$

Propriété:

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle du type $[a + \beta, b + \beta]$ où a , b et $\beta \in \mathbb{R}$ avec $a \leq b$, alors

$$\int_a^b f(x + \beta) dx = \int_{a+\beta}^{b+\beta} f(t) dt$$

Changement de variable du type $x \rightarrow x + \beta$

Exemple:

On se propose de calculer l'intégrale $I = \int_{-3}^{-2} (x + 3)^2 dx$.

- On peut faire le calcul directement en remarquant qu'une primitive de $(x + 3)^2$ sur $[-3, -2]$ est $\frac{1}{3}(x + 3)^3$.
- On peut également effectuer une translation de manière à effectuer un calcul plus simple :

$$I = \int_{-3}^{-2} (x + 3)^2 dx = \int_0^1 t^2 dt = \left[\frac{1}{3}x^3 \right]_0^1 = \frac{1}{3}.$$

Changement de variable du type $x \rightarrow \alpha x$ lorsque $\alpha \neq 0$

Propriété:

Soit f une fonction dérivable sur l'intervalle $[\alpha a, \alpha b]$, où $\alpha \neq 0$, alors

$$\int_a^b f(\alpha x) dx = \frac{1}{\alpha} \int_{\alpha a}^{\alpha b} f(x) dx$$

Changement de variable du type $x \rightarrow \alpha x$ lorsque $\alpha \neq 0$

Exemple:

On se propose de calculer $I = \int_0^1 e^{2x} dx$:

- $I = \int_0^1 e^{2x} dx = \frac{1}{2} \int_0^2 e^t dt = \frac{1}{2} [e^t]_0^2 = \frac{1}{2} (e^2 - 1).$

Cas général : changement de variable du type $x \rightarrow \varphi(x)$

Propriété:

Soit φ une fonction dérivable sur un intervalle $I = [a, b]$ dont la dérivée est dérivable sur I .

Pour toute fonction f définie et continue sur l'intervalle $f(I)$, on a :

$$\int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(x) dx = \int_a^b f[\varphi(t)] \varphi'(t) dt.$$

Cas général : changement de variable du type $x \rightarrow \varphi(x)$

Exemple:

Calculons l'intégrale $\int_1^4 \frac{dx}{x + \sqrt{x}}$ en posant $t = \sqrt{x}$, ce qui équivaut à $x = t^2 = \varphi(t)$:

- On calcule les nouvelles bornes d'intégration :

Pour $x \in [1, 4]$, on obtient $t \in [1, 2]$

- On exprime l'expression à intégrer par rapport à la nouvelle variable : on a

$$\frac{1}{x + \sqrt{x}} dx = \frac{1}{\varphi(t) + \sqrt{\varphi(t)}} \varphi'(t) dt = \frac{1}{t^2 + t} \times 2t dt.$$

- Donc :
$$\begin{aligned} \int_1^4 \frac{dx}{x + \sqrt{x}} &= \int_1^2 \frac{2t dt}{t^2 + t} \\ &= 2 \int_1^2 \frac{1}{t + 1} dt \\ &= 2 [\ln(1 + t)]_1^2 \\ &= 2(\ln 3 - \ln 2) \\ &= 2 \ln \left(\frac{3}{2}\right). \end{aligned}$$