

# 1 Calcul vectoriel & Produit scalaire


## 1.1 Compétences Attendues

- Utiliser le produit scalaire pour démontrer une orthogonalité, pour calculer un angle, une longueur dans le plan ou dans l'espace.
- En vue de la résolution d'un problème, calculer le produit scalaire de deux vecteurs en choisissant une méthode adaptée (en utilisant la projection orthogonale, à l'aide des coordonnées, à l'aide des normes et d'un angle, à l'aide de normes).
- Utiliser le produit scalaire pour résoudre un problème géométrique.

## 1.2 Exercices

### Exercice 1:


Calculer  $\langle \vec{AB}, \vec{AC} \rangle$  dans chaque cas. Les carrés du quadrillage sont de côté 1.



### Exercice 2:

Calculer les valeurs des produits scalaires suivants. Les carrés du quadrillage sont de côté 1.

- |                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ | 4. $\langle \vec{w}, \vec{u} \rangle$ |
| 2. $\langle \vec{t}, \vec{w} \rangle$ | 5. $\langle \vec{v}, \vec{w} \rangle$ |
| 3. $\langle \vec{m}, \vec{h} \rangle$ | 6. $\langle \vec{m}, \vec{u} \rangle$ |




### Exercice 3:

1. Pour chaque figure ci-dessous, calculer :


- (a)  $\|\vec{u}\|$  et  $\|\vec{v}\|$  | (b)  $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$

2. En déduire la valeur de l'angle géométrique  $\alpha$ .



### Exercice 4:

Dans chaque cas, calculer le produit scalaire  $\langle \vec{AB}, \vec{AC} \rangle$  en choisissant une méthode adaptée.



### Exercice 5:

Soit  $ABC$  un triangle.

1. Déterminer, si possible, la longueur  $AC$ .

- (a)  $AB = 3, \langle \vec{AB}, \vec{AC} \rangle = -6, \widehat{BAC} = 60^\circ$ .  
 (b)  $AB = 5, \langle \vec{AB}, \vec{AC} \rangle = -10, \widehat{BAC} = 135^\circ$ .

2. Déterminer, si possible, une mesure de l'angle  $\widehat{BAC}$ .

- (a)  $AB = 2, AC = \sqrt{2} \langle \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC} \rangle = -2.$
- (b)  $AB = 5, AC = 2 \langle \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC} \rangle = 15.$
- (c)  $AB = 3, AC = 4 \langle \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC} \rangle = 12.$

**Exercice 6:**

Soient  $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$  deux vecteurs du plan. Calculer les produits scalaires suivants :

- |   |   |
|---|---|
| 1. $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$   | 3. $\langle -\vec{u}, 2\vec{v} \rangle$                   |
| 2. $\langle \vec{u}, -4\vec{v} \rangle$ | 4. $\langle \vec{u} + \vec{v}, \vec{u} - \vec{v} \rangle$ |

**Exercice 7:**

$ABCD$  est un rectangle de longueur  $AB = 6$  et de largeur  $AC = 4$ .  $E$  est un point du segment  $[AB]$  défini par  $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB}$ .  $F$  est le projeté orthogonal du point  $B$  sur la droite  $(ED)$ .

1. En calculant le produit scalaire  $\langle \overrightarrow{EC}, \overrightarrow{ED} \rangle$  de deux façons différentes, calculer l'angle  $\widehat{DEC}$ .
2. En calculant le produit scalaire  $\langle \overrightarrow{DB}, \overrightarrow{DE} \rangle$  de deux façons différentes, calculer la longueur  $BF$ .

**Exercice 8:**

Dans chaque cas, calculer le produit scalaire  $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$  et déterminer la (ou les) valeur(s) éventuelle(s) de  $m$  telle(s) que les vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  soient orthogonaux.

- |   |   |
|---|---|
| 1. $\vec{u} = \begin{pmatrix} 5-m \\ m \end{pmatrix}$ et $\vec{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$   | 3. $\vec{u} = \begin{pmatrix} -m \\ -2 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} = \begin{pmatrix} m \\ 4 \end{pmatrix}$ |
| 2. $\vec{u} = \begin{pmatrix} m-2 \\ m \end{pmatrix}$ et $\vec{v} = \begin{pmatrix} 3-m \\ m \end{pmatrix}$ | 4. $\vec{u} = \begin{pmatrix} m \\ -2 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ m \end{pmatrix}$  |


**Exercice 9:**

Soient  $A, B$  et  $C$  trois points du plan.

1. Dans chaque casn indiquer si le repère  $(A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$  est orthonormé.
  - (a)  $A(5; -6), B(4, 4; -5, 2)$  et  $C(4, 4; -6, 8)$
  - (b)  $A(1; 2), B(2; 2, 5)$  et  $C(0, 5; 1)$
2. Montrer que le repère  $(A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$  avec  $A(2; -7), B(1; -5)$  et  $C(0, 5; 1)$  n'est pas orthonormé.

**Exercice 10:**

$ABCD$  est un carré de côté 4.  $ABCD$  et  $BFHC$  sont deux rectangles de largeur 2. Etudier la perpendicularité des droites  $(AG)$  et  $(AH)$  en calculant le produit scalaire  $\langle \overrightarrow{AG}, \overrightarrow{AH} \rangle$ .



**Exercice 11:**

Soient  $A(6; 1)$  et  $B(-3; 3)$  deux points du plan et  $\mathcal{D}$  une droite d'équation  $y = 2x$  où  $x, y \in \mathbb{R}$ .

On cherche à déterminer s'il existe des points  $M$  appartenant à la droite  $\mathcal{D}$  tels que les droites  $(AM)$  et  $(BM)$  soient perpendiculaires. On note  $M(x; y)$ .

1. Si  $M \in \mathcal{D}$ , établir une relation entre  $x$  et  $y$ .
2. Exprimer en fonction de  $x$  les coordonnées des vecteurs  $\overrightarrow{MA}$  et  $\overrightarrow{MB}$ .
3. Calculer  $\langle \overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB} \rangle$  en fonction de  $x$  puis conclure.

**Exercice 12:**

Soient  $a \in \mathbb{R}$  et  $ABCD$  un carré de côté  $a$ .  $E$  est un point du segment  $[AB]$  et  $F$  le point du segment  $[AD]$  tel que  $AE = DF$ . On pose  $AE = x$ .

1. Exprimer en fonction de  $a$  et de  $x$  les produits scalaires  $\langle \overrightarrow{CD}, \overrightarrow{EA} \rangle$  et  $\langle \overrightarrow{DF}, \overrightarrow{AD} \rangle$ .
2. Démontrer que les droites  $(CF)$  et  $(ED)$  sont perpendiculaires.

**Exercice 13:**

Soient  $R(-2; 3), S(4; 5)$  et  $T(3; -2)$  sont trois points du plan. Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal du point  $T$  sur la droite  $(RS)$ , c'est-à-dire le point  $U \in (RS)$  tel que  $(TU) \perp (RS)$ .

**Exercice 14:**

1. Dans un triangle  $ABC$ ,  $AB = 6, AC = 15$  et  $BC = 10$ . Calculer une valeur approchée de la mesure de chaque angle.
2. Dans un triangle  $DEF$ ,  $DE = 10, DF = 7$  et  $\widehat{D} = 60^\circ$ .

3. Sachant que  $IJ = 32$ ,  $IK = 20$  et que  $\widehat{JIK} = 30^\circ$ , calculer la longueur  $JK$ .

4. Estimer l'angle  $\widehat{GHL}$ , sachant que  $GH = 22$ ,  $HL = 21$  et  $GL = 25$ .

**Exercice 15:**

Le triangle  $MNP$  est défini par  $MN = 9$ ,  $MP = 5$  et  $NP = 7,5$ . On note  $M'$ ,  $N'$  et  $P'$  les milieux respectifs des segments  $[NP]$ ,  $[MP]$  et  $[MN]$ . Calculer la longueur de chaque médiane.


**Exercice 16:**

On donne  $AB = 5$ ,  $BC = 3$  et  $\widehat{B} = 60^\circ$ .

1. Calculer la longueur  $AC$ .
2. En déduire  $\widehat{A}$  puis  $\widehat{C}$ .


**Exercice 17:**

Déterminer la longueur du chemin  $E - B - D$ .



**Exercice 18:**

Le triangle  $ABC$  est tel que  $AC = 7$ ,  $AB = 10$  et  $BC = 6,5$ .



1. Déterminer une mesure de l'angle  $\widehat{ACB}$ .
2. Sachant que  $\widehat{BCD} = \frac{1}{2}\widehat{ACB}$ , déterminer une valeur approchée de  $CE$ , où  $E$  est le milieu du segment  $[BD]$ .

**Exercice 19:**

Le segment  $[GH]$  est de longueur 10.

1. Justifier que l'ensemble des points  $M$  tels que  $\langle \overrightarrow{MG}, \overrightarrow{MH} \rangle = 5$  est un cercle.
2. En déduire la nature de l'ensemble des points  $M$  tels que  $\langle \overrightarrow{MG}, \overrightarrow{MH} \rangle \leq 5$ .

**Exercice 20:**

Le segment  $[EF]$  est de longueur  $3\text{cm}$ . Le point  $P$  appartient à la demi-droite  $[FE)$  et est tel que  $EP = 7$ . Déterminer la valeur du réel  $k$  tel que l'égalité  $\langle \overrightarrow{EP}, \overrightarrow{EF} \rangle = k$  soit vérifiée.

**Exercice 21:**

Soient deux points  $C$  et  $D$  tels que  $CD = 6$ , on note :

- $\mathcal{D}_1$  l'ensemble des points  $P$  tels que  $\langle \overrightarrow{CP}, \overrightarrow{CD} \rangle = 12$ .
- $\mathcal{D}_2$  l'ensemble des points  $Q$  tels que  $\langle \overrightarrow{CQ}, \overrightarrow{CD} \rangle = 3$ .
- $\mathcal{C}$  l'ensemble des points  $M$  tels que  $3 \leq \langle \overrightarrow{CM}, \overrightarrow{CD} \rangle \leq 12$ .

1. Déterminer les ensembles  $\mathcal{D}_1$  et  $\mathcal{D}_2$ .
2. En déduire la nature de l'ensemble  $\mathcal{C}$ .
3. Représenter l'ensemble  $\mathcal{C}$ .

**Exercice 22:**

Soit  $[GH]$  un segment de longueur 10.

1. On note  $\mathcal{C}$  des points  $M$  tels que :

$$GM^2 + HM^2 = 56$$

- (a) On note  $I$  le milieu du segment  $[GH]$ . En utilisant une formule de la médiane, démontrer que  $M \in \mathcal{C} \iff MI = \sqrt{3}$ .
- (b) Conclure quant à la nature de l'ensemble  $\mathcal{C}$ .

2. Soit  $k \in \mathbb{R}$ , on note  $\mathcal{C}_k$  l'ensemble des points  $M$  tels que

$$GM^2 + HM^2 = k$$

Déterminer l'ensemble des valeurs de  $k$  telles que  $\mathcal{C}_k$  soit l'ensemble vide.

**Exercice 23:**

A et B sont deux points du plan tels que  $AB = 1$ . On note  $\mathcal{F}$  l'ensemble des points M tels que  $\frac{MA}{MB} = 3$ .

1. Montrer que  $M \in \mathcal{F} \iff MA^2 - 9MB^2 = 0$ .
2. On définit les points P et Q tels que :

$$\vec{AP} + 3\vec{BP} = \vec{0}$$

et

$$\vec{AQ} - 3\vec{BQ} = \vec{0}$$

Construire les points P et Q.

3. Justifier que  $P, Q \in \mathcal{F}$ .
4. Exprimer  $\vec{MA} + 3\vec{MB}$  en fonction de  $\vec{MP}$  et  $\vec{MA} - 3\vec{MB}$  en fonction de  $\vec{MQ}$ .
5. En déduire que  $M \in \mathcal{F} \iff \langle \vec{MP}, \vec{MQ} \rangle = 0$ .
6. Conclure quant à la nature de l'ensemble  $\mathcal{F}$  puis construire cet ensemble.

**Exercice 24:**

Soient A et B deux points du plan tels que  $AB = 5$ . On note  $\mathcal{F}$  l'ensemble des points M tels que :

$$\|\vec{MA} + \vec{MB}\| = MA$$

1. On note I le milieu du segment  $[AB]$ . Exprimer  $\|\vec{MA} + \vec{MB}\|$  en fonction de MI.
2. En déduire que  $M \in \mathcal{F} \iff MA^2 - 4MI^2 = 0$ .
3. On définit les points C et D tels que :

$$\vec{AC} + 2\vec{IC} = \vec{0}$$

et

$$\vec{AD} - 2\vec{ID} = \vec{0}$$


Justifier que  $C, D \in \mathcal{F}$ .

4. Exprimer  $\vec{MA} + 2\vec{MI}$  en fonction de  $\vec{MC}$  et  $\vec{MA} - 2\vec{MI}$  en fonction de  $\vec{MD}$ .
5. En déduire que  $M \in \mathcal{F} \iff \langle \vec{MC}, \vec{MD} \rangle = 0$ .

6. Conclure quant à la nature de l'ensemble  $\mathcal{F}$  puis construire cet ensemble.

**Exercice 25:**


Le triangle QNZ est isocèle en Q avec  $QN = 1$  et  $\widehat{Q} = 30^\circ$ .



1. Calculer la longueur NZ.
2. On note H le pied de la hauteur issue de Q.
  - (a) Justifier que H est le milieu du segment  $[NZ]$  et que  $\widehat{ZQH} = 15^\circ$ .
  - (b) En déduire  $\sin(15^\circ)$ .
  - (c) Calculer la longueur HQ. En déduire  $\cos(15^\circ)$ .

**Exercice 26:**

Afin d'estimer la longueur AG, on part d'une mesure connue ( $BC = 16\text{km}$ ) et on construit une chaîne de triangles dont les angles sont de mesures connues. Estimer la longueur AG.



### 1.3 Algorithmes et Python

#### Exercice 27:

1. Ecrire un programme Python qui prend en argument les coordonnées d'un vecteur et qui calcule le carré de la norme de ce vecteur.
2. Soient  $\vec{u} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} = \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}$  deux vecteurs du plan. Recopier et compléter la fonction ci-dessous afin qu'elle renvoie le produit scalaire  $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ .

```

1     def produiscalaire(a,b,c,d):
2         u=a**2+b**2
3         v=c**2+d**2
4         z=....
5         w=0.5*(.....-.....-.....)
6         return w

```

#### Exercice 28:

Ecrire une fonction Python qui prend en argument les coordonnées de deux vecteurs et qui vérifie s'ils sont orthogonaux.

### 1.4 Approfondissements

#### Exercice 29:

Dans un triangle  $ABC$ , on note  $H_A, H_B$  et  $H_C$  les pieds des hauteurs respectivement issues de  $A, B$  et  $C$ .


On note  $a = BC, b = AC$  et  $c = AB$ .

1. Exprimer l'aire  $\mathcal{A}$  du triangle  $ABC$  de trois manières différentes à l'aide des trois hauteurs.
2. Déterminer  $\sin(\hat{A}), \sin(\hat{B})$  et  $\sin(\hat{C})$  en fonction de  $a, b$  et  $c$ .
3. En déduire la loi des sinus :

$$\frac{\sin(\hat{A})}{a} = \frac{\sin(\hat{B})}{b} = \frac{\sin(\hat{C})}{c} = \frac{2\mathcal{A}}{abc}$$


#### Exercice 30:

Afin de repérer un rocher placé en  $R$ , un marin mesure depuis les points  $A$  et  $B$ , espacés de 5 milles marins (1 mille marin = 1852 mètres), deux angles :  $\widehat{RAB}$  et  $\widehat{ABR}$ . Déterminer les longueurs  $AR$  et  $BR$ .



#### Exercice 31:

Afin d'estimer la hauteur (antenne comprise) d'une des tours de la Cité administrative de Bordeaux (représentée par le segment  $[AC]$ ), Lina fait deux relevés d'angle depuis la rue Georges Mandel. Elle a parcouru 100 mètres entre les deux relevés, marqués par les points  $M$  et  $N$ .



1. Estimer la hauteur de la Cité administrative.
2. A quelle distance se trouvait Lina de la Cité au moment du premier relevé ?