

Exercice 1: Automatismes (... / 3 points)

1. Développer l'expression $A(x) = (2x - 3)(6 - 7x)$.
2. Factoriser l'expression $B(x) = (5 - 2x)(6 + x) - (2 + 3x)(5 - 2x)$.
3. Résoudre l'équation $4x - 7 = -11x + 23$.


Solution :

1. $A(x) = -14x^2 + 33x - 18$
2. $B(x) = (5 - 2x)(4 - 2x)$
3. $x = 2$

Exercice 2: Tronc commun (... / 3 points)

Soit f la fonction définie sur l'intervalle $[-2;4]$ dont la courbe représentative \mathcal{C} dans un repère orthonormé est donnée ci-dessous :

1. Utiliser ce graphique pour déterminer la valeur de $f(1)$.
2. Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = 3$.
3. Résoudre graphiquement sur $[-2; 4]$ l'inéquation $f(x) \geq 0$.

*Solution :*

1. Par lecture graphique on a $f(1) = 4$
2. Par lecture graphique on a deux solutions : $x = 0$ ou $x = 2$
3. Par lecture graphique on trouve l'intervalle de solution $[-1; 3]$

Exercice 3: Spécialité Maths-Physique (... / 2 points)

On considère la fonction f définie pour tout réel x par :

$$f(x) = \cos(2x - \pi) + 5x^3$$

1. Déterminer une primitive F de f .
2. En déduire la valeur de l'intégrale :

$$\int_0^\pi f(x)dx$$

Solution :

1. La fonction F définie par $F(x) = \frac{1}{2} \sin(2x - \pi) + \frac{5}{4}x^4$ est une primitive de f .

2. On a :

$$\begin{aligned}
 \int_0^\pi f(x)dx &= F(\pi) - F(0) \\
 &= \left(\frac{1}{2} \sin(\pi) + \frac{5}{4}\pi^4 \right) - \left(\frac{1}{2} \sin(0) + \frac{5}{4} \times 0^4 \right) \\
 &= \frac{5}{4}\pi^4
 \end{aligned} \tag{1}$$

Exercice 1: Automatismes (... / 3 points)

1. Développer l'expression $A(x) = (3x - 1)(6 - 5x)$.
2. Factoriser l'expression $B(x) = (5 - 2x)(6 + x) - (6 + x)(5 - 7x)$.
3. Résoudre l'équation $5x - 9 = -13x + 27$.


Solution :

1. $A(x) = -15x^2 + 23x - 6$
2. $B(x) = 5x(6 + x)$
3. $x = 2$

Exercice 2: Tronc commun (... / 3 points)

Soit f la fonction définie sur l'intervalle $[-2; 4]$ dont la courbe représentative \mathcal{C} dans un repère orthonormé est donnée ci-dessous :

1. Utiliser ce graphique pour déterminer la valeur de $f(-1)$.
2. Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = -3$.
3. Résoudre graphiquement sur $[-2; 4]$ l'inéquation $f(x) \leq 0$.

*Solution :*

1. Par lecture graphique on a $f(-1) = -4$
2. Par lecture graphique on a deux solutions : $x = -2$ ou $x = 0$
3. Par lecture graphique on trouve l'intervalle de solution $[-3; 1]$

Exercice 3: Spécialité Maths-Physique (... / 2 points)

On considère la fonction f définie pour tout réel x par :

$$f(x) = \sin(2x - \pi) + 7x^2$$

1. Déterminer une primitive F de f .
2. En déduire la valeur de l'intégrale :

$$\int_0^\pi f(x)dx$$

Solution :

1. La fonction F définie par $F(x) = -\frac{1}{2} \cos(2x - \pi) + \frac{7}{3}x^3$ est une primitive de f .
2. On a :

$$\begin{aligned}
 \int_0^\pi f(x)dx &= F(\pi) - F(0) \\
 &= \left(-\frac{1}{2} \cos(\pi) + \frac{7}{3}\pi^3 \right) - \left(-\frac{1}{2} \cos(0) + \frac{7}{3} \times 0^3 \right) \\
 &= 1 + \frac{7}{3}\pi^3
 \end{aligned} \tag{2}$$