


1 Périmètres, aires et volumes

- Triangle:



- Périmètre :

- Aire :


- Carré:



- Périmètre :

- Aire :


- Rectangle:



- Périmètre : $\mathcal{P}_{rectangle} =$

- Aire : $\mathcal{A}_{rectangle} =$


- Losange:



- Périmètre : $\mathcal{P}_{losange} =$

- Aire : $\mathcal{A}_{losange} =$


- Parallélogramme:



- Périmètre : $\mathcal{P}_{parallélogramme} =$

- Aire : $\mathcal{A}_{parallélogramme} =$


- Cercle:



- Périmètre : $\mathcal{P}_{cercle} =$

- Aire : $\mathcal{A}_{cercle} =$


- Arc de cercle:



- Périmètre : $\mathcal{P}_{arc} =$


- Aire : $\mathcal{A}_{arc} =$

- Cube:




- Volume : $\mathcal{V}_{cube} =$

- Pavé droit:




- Volume : $\mathcal{V}_{pavé} =$

- Prisme droit:




- Volume : $\mathcal{V}_{prisme} =$

• Cône:




- Volume : $V_{cône} =$

Boule:




- Volume : $V_{boule} =$

• Pyramide:



- Volume : $V_{pyramide} =$

• Cylindre:




- Volume : $V_{cylindre} =$

2 Géométrie du triangle

2.1 Théorème de Pythagore

Théorème :



Dans un triangle ABC de plus grand côté BC comme suit :



2.2 Théorème de Thalès

Théorème :


Les droites (BM) et (CN) sont sécantes en A .



2.3 Trigonométrie

Théorème :

Dans un triangle ABC rectangle en A comme suit :



• $\cos(\theta) =$


• $\sin(\theta) =$

• $\tan(\theta) =$

2.4 Loi des sinus

Théorème :

Soit ABC un triangle quelconque. On note : $\begin{cases} a = BC & b = CA \\ \hat{A} = \widehat{BAC} & \hat{B} = \widehat{ABC} \\ \hat{C} = \widehat{BCA} \end{cases}$




On a :

2.5 Théorème d'Al-Kashi

Théorème :

Soit ABC un triangle quelconque. On note : $\begin{cases} a = BC & b = CA \\ \hat{A} = \widehat{BAC} & \hat{B} = \widehat{ABC} \\ \hat{C} = \widehat{BCA} \end{cases}$




On a :

3 Représage

Dans le plan, muni d'un repère orthonormé $(O ; \vec{i} ; \vec{j})$ direct, tout point M peut être repéré par :

- **Les coordonnées cartésiennes** $(x; y)$ avec x et y tels que $\overrightarrow{OM} = x \vec{i} + y \vec{j}$.
- **Les coordonnées polaires** $(r; \theta)$ avec $r = OM$ et $\theta = (\vec{i}; \overrightarrow{OM})$



Propriété :

- En connaissance des coordonnées cartésiennes d'un point $(x; y)$, on peut déterminer ses coordonnées polaires $(r; \theta)$ avec :

$$r = \quad \text{et} \quad \theta =$$

- En connaissance des coordonnées polaires d'un point $(r; \theta)$, on peut déterminer ses coordonnées cartésiennes $(x; y)$ avec :

$$x = \quad \text{et} \quad y =$$