

Exercice 1: Automatismes (... / 3 points)

1. Un sac coûte 156 euros. Le prix baisse de 49 %. Le nouveau prix en euros est :

- | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|
| (a) $156 \times 1,49$ | (b) $156 \times \frac{49}{100}$ | (c) $156 \times \left(1 + \frac{49}{100}\right)$ | (d) $156 \times \frac{51}{100}$ |
|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|

2. Le prix d'un article est noté P . Il connaît deux augmentations successives de 30 %.

Le prix après ces augmentations est :

- | | | | |
|----------------------------|--------------------|--|--------------------|
| (a) $P \times (1,3 + 0,3)$ | (b) $P \times 0,6$ | (c) $P \times \left(1 + \frac{30}{100}\right)^2$ | (d) $P \times 1,6$ |
|----------------------------|--------------------|--|--------------------|

3. Le prix d'un article a diminué de 7,5 %.

Pour retrouver son prix avant la réduction, il faut multiplier son prix actuel par :

- | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| (a) $\frac{1}{1,075}$ | (b) $\frac{1}{0,075}$ | (c) $\frac{1}{0,925}$ | (d) 0,925 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|

Exercice 2: Tronc commun (... / 3 points)


Soit f une fonction dont on donne la représentation graphique ci-contre.

1. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe au point A représentée sur le graphique ci contre.

2. On admet que la tangente à la courbe au point B admet pour équation $y = 2x - 11$.

- En déduire la valeur de $f'(4)$.
- Représenter graphiquement la tangente à la courbe au point B .

Solution :



Exercice 3: Spécialité Maths-Physique (. . . / 3 points)

1. Donner la valeur de $\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right)$.

On pourra s'appuyer sur le cercle trigonométrique.

2. Résoudre dans \mathbb{C} l'équation : $(3 - i)z - 2 - 5i = 0$.

On écrira la solution sous forme algébrique.

3. Dans un repère orthonormé on considère les vecteurs $\vec{u} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 9 \end{pmatrix}$ et $\vec{w} = \begin{pmatrix} -3 \\ 8 \end{pmatrix}$.

Calculer $\vec{u} \cdot (\vec{v} - \vec{w})$.

Solution :

Exercice 1: Automatismes (... / 3 points)

1. Un sac coûte 154 euros. Le prix baisse de 40 %. Le nouveau prix en euros est :

- | | | | |
|---------------------------------|----------------------|--|--|
| (a) $154 \times \frac{60}{100}$ | (b) $154 \times 0,4$ | (c) $154 \times \left(1 + \frac{40}{100}\right)$ | (d) $15,4 \times \left(\frac{100 - 40}{40}\right)$ |
|---------------------------------|----------------------|--|--|

2. Le prix d'un article est noté P . Il connaît deux augmentations successives de 40 %.

Le prix après ces augmentations est :

- | | | | |
|--|----------------------|----------------------------|----------------------|
| (a) $P \times \left(\frac{40}{100}\right)^2$ | (b) $\frac{P}{1,96}$ | (c) $P \times (1,4 + 0,4)$ | (d) $P \times 1,4^2$ |
|--|----------------------|----------------------------|----------------------|

3. Le prix d'un article a diminué de 2,5 %.

Pour retrouver son prix avant la réduction, il faut multiplier son prix actuel par :

- | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|
| (a) $\frac{1}{1,025}$ | (b) $\frac{1}{0,025}$ | (c) 0,975 | (d) $\frac{1}{0,975}$ |
|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|

Exercice 2: Tronc commun (... / 3 points)


Soit f une fonction dont on donne la représentation graphique ci-contre.

1. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe au point A représentée sur le graphique ci contre.

2. On admet que la tangente à la courbe au point B admet pour équation $y = 4x - 20$.

- En déduire la valeur de $f'(5)$.
- Représenter graphiquement la tangente à la courbe au point B .

Solution :



Exercice 3: Spécialité Maths-Physique (. . . / 3 points)

1. Donner la valeur de $\cos\left(\frac{\pi}{2}\right)$.

On pourra s'appuyer sur le cercle trigonométrique.

2. Résoudre dans \mathbb{C} l'équation : $(5 - 6i)z - 3 - i = 0$.

On écrira la solution sous forme algébrique.

3. Dans un repère orthonormé on considère les vecteurs $\vec{u} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\vec{v} = \begin{pmatrix} -6 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\vec{w} = \begin{pmatrix} -8 \\ -6 \end{pmatrix}$.

Calculer $\vec{u} \cdot (\vec{v} - \vec{w})$.

Solution :