

Chapitre 4 : Probabilités conditionnelles

Axel Carpentier

Terminale technologique :

Tronc commun

Table des matières

1. Probabilité conditionnelle
2. Indépendance
3. Arbre de probabilités
4. Exercice bilan

1. Probabilité conditionnelle

2. Indépendance

3. Arbre de probabilités

4. Exercice bilan

Définition:

Soit Ω l'univers d'une expérience aléatoire. On considère un évènement B dans Ω de probabilité non nulle $\mathbb{P}(B) \neq 0$.

Pour tout évènement A , on appelle probabilité de A sachant B , noté $\mathbb{P}_B(A)$ (ou $\mathbb{P}(A|B)$) la quantité :

$$\mathbb{P}_B(A) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\text{Nombre de cas pour } A \cap B}{\text{Nombre de cas pour } B}$$

D'après la définition précédente, on a que pour deux événements A et B :

$$\mathbb{P}_B(A) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} \quad \text{et} \quad \mathbb{P}_A(B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)}$$

On en déduit donc la propriété suivante :

Propriété:

Dans certain cas on peut être amené à connaître la probabilité conditionnelle.

On a alors $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(B) \times \mathbb{P}_B(A) = \mathbb{P}(A) \times \mathbb{P}_A(B)$

ATTENTION

Les quantités $\mathbb{P}_B(A)$ et $\mathbb{P}_A(B)$ n'ont aucune raisons d'être égales

Probabilité conditionnelle

Exemple:

Dans un sac de dragées, 60% des dragées sont de couleur bleue, 30% des dragées sont bleues et à l'amande et 40% des dragées bleues sont au chocolat. On choisit une dragée au hasard dans le sac. On note les événements :

- A : "la dragée est à l'amande"
- B : "la dragée est bleue"
- C : "la dragée est au chocolat"

La probabilité d'obtenir une dragée à l'amande sachant qu'elle est bleue est :

$$\mathbb{P}_B(A) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{0,3}{0,6} = 0,5$$

La probabilité d'obtenir une dragée bleue et au chocolat est :

$$\mathbb{P}(B \cap C) = \mathbb{P}(B) \times \mathbb{P}_B(C) = 0,6 \times 0,4 = 0,24$$

1. Probabilité conditionnelle

2. Indépendance

3. Arbre de probabilités

4. Exercice bilan

Définition:

Deux événements A et B sont dits indépendants si :

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \times \mathbb{P}(B)$$

C'est-à-dire si :

$$\mathbb{P}_B(A) = \mathbb{P}(A)$$

Exercice:

On lance deux fois de suite une pièce de monnaie.


On considère les événements A : "obtenir pile au premier lancer" et B : "obtenir deux résultats identiques". Ces deux événements sont-ils indépendants ?

Arbre de probabilités

1. Probabilité conditionnelle
2. Indépendance
3. Arbre de probabilités
4. Exercice bilan

Définition:

Considérons une expérience aléatoire quelconque d'univers Ω et deux événements A et B . Il est possible de représenter les possibilités de l'expérience aléatoire par un arbre de probabilité :



Définition:

- Une branche (ou segment) représente une probabilité, conditionnelle à partir du premier événement.
- Un noeud est une jonction entre deux branches, représentant un événement conditionnant un autre.
- Un chemin est un événement finalement réalisé, en suivant des branches successives.

Propriété:


- La somme des probabilités des branches issues d'un noeud est 1.
- La probabilité d'un chemin est le produit des probabilités associées à ses branches.
- La probabilité d'un événement est la somme des probabilités des chemins qui y mènent :

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(\bar{A} \cap B) + \mathbb{P}(A \cap B)$$

Arbre de probabilités

Exemple:

On reprend l'exemple précédent :



On en déduit : $\mathbb{P}(\bar{B}) = 0,4$ et $\mathbb{P}_B(\bar{A}) = 0,5$ et on retrouve les résultats précédemment trouvés.

Propriété: *Formule des probabilités totales*

Soit A_1, A_2, A_3 des événements deux à deux disjoints et B un événement quelconque. On a alors :

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A_1 \cap B) + \mathbb{P}(A_2 \cap B) + \mathbb{P}(A_3 \cap B)$$

1. Probabilité conditionnelle
2. Indépendance
3. Arbre de probabilités
4. Exercice bilan

Un site internet a une audience séparée en deux types : les respectueux qui représentent 90% des inscrits et les trolls 10%. Les premiers ont une probabilité de 0,1 de participer à une discussion houleuse sur une journée, les seconds 0,7.

Un nouvel utilisateur s'inscrit. On définit les événements suivants :

- T : "le nouvel arrivant est un troll".
- H : "Le nouvel arrivant participe à une discussion houleuse".

Construire un arbre pondéré représentant la situation puis calculer $\mathbb{P}(H)$.