

Chapitre 4 : Fonction logarithme

Table des matières

Chapitre 4 : Fonction logarithme	1
Axel CARPENTIER	
Contenu	2
1 Logarithme népérien	3
2 Etude de la fonction logarithme	3
2.1 Définition	3
2.2 Dérivation	4
2.3 Limites et variations	4
3 Relation fonctionnelle	5
4 Croissances comparées	6
5 Exercice bilan	6

Contenu

- Définition du logarithme népérien de a pour $a > 0$ comme unique solution de l'équation $e^x = a$; notation $\ln$.
- Sens de variation.
- Propriétés algébriques : $\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b)$, $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b)$ et $\ln(a^x) = x \ln(a)$ pour n entier, x réel, a et b réels strictement positifs.
- Lien avec le logarithme décimal.
- Courbe représentative.
- Limites en 0 et $+\infty$.

1 Logarithme népérien

Définition:

Soit $a \in \mathbb{R}_+^*$, on appelle logarithme népérien de a l'unique solution de l'équation $e^x = a, x \in \mathbb{R}$. Autrement dit on a:

$$e^x = a \iff x = \ln(a)$$

! Remarque

- On a $\ln(1) = 0$ et $\ln(e) = 1$.
- On notera $\ln x$ au lieu de $\ln(x)$ lorsqu'il n'y a pas d'ambiguïtés.
- Le logarithme népérien d'un nombre réel nul ou négatif n'existe pas.

Propriété :

- Soit $x > 0$, $e^{\ln(x)} = x$.
- Soit $x \in \mathbb{R}$, $\ln(e^x) = x$

Exemple:

- $e^{\ln(5)} = 5$
- $\ln(e^{-0,1}) = -0,1$
- $\ln(\sqrt{e}) = \ln(e^{0,5}) = 0,5$

Exercice:

Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation $e^{3x+2} = 5$

2 Etude de la fonction logarithme

2.1 Définition

Définition:

On appelle fonction logarithme népérien la fonction de $\mathbb{R}_+^*$ dans $\mathbb{R}$ définie par $\ln : x \mapsto \ln(x)$.

! Remarque

Dans le tronc commun, nous avons étudié la fonction logarithme décimal qui a un lien très étroit avec la fonction logarithme népérien. En effet, on a pour tout réel x strictement positif :

$$\log(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(10)}$$

2.2 Dérivation

Propriété:

La fonction logarithme est dérivable sur $]0; +\infty[$ et pour tout $x > 0$:

$$\ln'(x) = \frac{1}{x}$$


Exercice:

Déterminer sur $\mathbb{R}_+^*$ l'expression de la dérivée de la fonction $f : x \mapsto x \ln(x)$.

2.3 Limites et variations

Propriété:

- La fonction logarithme est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+^*$.
- On a de plus :
 - $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) = -\infty$
 - $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty$



Exercice:

Etudier les variations sur $]0; +\infty[$ de la fonction $f : x \mapsto x \ln(x)$.

3 Relation fonctionnelle

Propriété:

Soient $a, b \in \mathbb{R}_+^*$ et $n \in \mathbb{Z}$:

- $\ln(a \times b) = \ln(a) + \ln(b)$
- $\ln\left(\frac{1}{a}\right) = -\ln(a)$
- $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b)$
- $\ln(a^n) = n \ln(a)$

! Remarque

Cette propriété se généralise pour plusieurs facteurs.

Exercice:

Simplifier les expressions suivantes :

- $A = \ln(1000) - \ln(0,1) + \ln(0,01)$
- $B = \ln(32) - 7 \ln(2) + \ln\left(\frac{1}{8}\right)$

Propriété:

Soit $a, b \in \mathbb{R}_+^*$:

- $a = b \iff \ln(a) = \ln(b)$
- $a < b \iff \ln(a) < \ln(b)$

Exercice:

Résoudre les équations et les inéquations suivantes pour tout $x \in \mathbb{R}$.

- $\ln(x) = 6$
- $\ln(x^4) < 3 \ln(x^2)$
- $\ln(x^2) - \ln(2) = 0$
- $\ln(1 + 5x) - 6 < 0$

4 Croissances comparées

Théorème: *Croissances comparées*

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, on a :

- $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^n \ln(x) = 0$

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x^n} = 0$

! Remarque

Le théorème précédent signifie que la croissance de $x \mapsto x^n$ est plus rapide que $x \mapsto \ln(x)$.

5 Exercice bilan

1. Résoudre l'équation $148 - 10 \ln(x) = 136 - 7,5 \ln(x)$.
2. Simplifier l'expression $3 \ln(2x) - \ln(8)$.
3. Résoudre l'équation $480e^{-\frac{1}{95}t} + 20 = 280$.